

## MAGYARORSZÁGI ÚJ BRACONIDÁK.

SZÉPLIGETI Győző-től.

## NEUE BRACONIDEN AUS UNGARN.

VON Gy. SZÉPLIGETI.

Subfam. HECABOLINAE.

1. *Cœnophanes cingulatus* ♀.

A potroh lapátalakú, az első és második íz hosszant barázdás, harántfutó barázda nélkül. A szárnyak hosszúak.

Fekete; a csáp töve, az előtor és a lábak vörösek; a tapogatók, a pikkely és a szárnyjegy sárga. — Hossza 3 mm., a tojócső hosszabb, mint a potroh.

*Szováta.* Gyűjtötte CSIKI ERNŐ.

2. *Hecabolus hungaricus* ♂ ♀.

Az arcz ránczos, a fejtető finoman harántul barázdás, a csápok 34 ízűek és vékonyak. A tor hengerded, ránczos; a középtor küzépső lebenye puposan kiálló; az utótor domború, tagoltsága kevésbé fejlett. A potroh lándzsaalakú; az első íz durván ránczos, két bordácskával; a második majdnem négyzetalakú, elül keskenyebb, barázdás, a közepén harántfutó és ivelt barázdával, elül a közepén egy négyszögletű, kimagasló és durván barázdás térséggel; a harmadik íz pontozottan ránczos; a 4-ik töve pontozott, különben, mint a következők, síma. A ♂ ugyanilyen, csakhogy a 4-ik íz hosszában barázdás és hátsó szárnyai ál-szárnyjeggyel ellátottak.

Fekete; a fej és a mell vörös, a fejtető barna; a lábak barnásvörösek, a hátsó czombok fölül barnák vagy feketék; a ♀ 2-ik potrohíze a kiemelkedő térség körül vörös. — Hossza 5 mm., a tojócső egyenlő a test hosszával.

*Pilis-Maróth* (♀) és *Novi* (♂).

Subfam. DORYCTINAE.

*Wachsmannia* n. gen.

A szárnyjegy belső oldala hosszabb, mint a külső, a nervulus érenálló, a középtor középső lebenye kiálló és egy mély barázda által osztott,

a potroh második varrata éles és egyenes, a második potrohíz kétszer hosszabb, mint a harmadik, a fej ránczos, a szárnyak foltosak.

### 3. *Wachsmannia maculipennis* ♀.

A fej koczkaalakú, szőrös és ránczos; a homlok lapos, közepén barázdával; a csápok 34 ízesek; a fej háta szegélyezett. A tor hengeres, szőrös és ránczos; a középtor három barázdával, a toroldalak barázdája csipkés; az utótor lapos, a háta két nagy és meglehetősen sima, a vége pedig három kicsiny és körded terecskével. A potroh bunkóalakú, hosszabb a fej és tornál, első íze hátsó szélességénél másfélszer hosszabb, hosszant barázdás, ülő, a tőfelén két tarajkával; a második íz harántszéles és kétszer oly hosszú, mint a 3-ik, hosszában barázdás; a második varrat jól látható és egyenes; a harmadik íz finoman érdes, hátsó széle és a következő ízek simák.

Fekete; a csápok vörösesbarnák; a szemkeret, a fej háta, a pajzs, a szárnytető előtti torrész és a középmell vörös; a harmadik és negyedik potrohíz sárgászörös, fekete szegélylyel, a következő ízek majdnem egészen feketék. A lábak sárgászörösek; a középső és hátsó csípők, a czombok (a közepük kivételével) és a száruk közepe fekete; az utóbbiak töve fehér. A szárnyak homályosak és foltosak, a szárnyjegy barna, a bordaér és a pikkely sárga. A tojócső hüvelye vöröses. — Hossza 5 mm., a tojócső egyenlő a test hosszával.

E nemet WACHSMANN JÁNOS úr tiszteletére neveztem el, ki e rovarját Pápa vidékén gyűjtötte.

#### Subfam. RHOGADINAE.

### 4. *Rhogas rugulosus* n. var. 3. ♀.

A pajzs közepe, az utótor, egy széles sáv a középtor oldalán, az első potrohíz és a második íz tövének közepe, vörös. Hasonló a *Rh. rugulosus* var. *pictus* KAVALL-hoz.

*Budapest.*

#### Subfam. CHELONINAE.

### 5. *Chelonus fissus* ♂.

A fej harántszéles, ránczos és fénytelen; a szájpajzs sűrűn pontozott. A csápízek száma 20. A tor ránczos, a középtor előre nyújtott és lapos hátú; az utótor 4 foggal fegyverzett. A potroh elliptikus, valamivel hosszabb a fej és a tornál, ránczos, a töve bordák hijján és tökéletlenül barázdás; a esücsnyílás igen hosszú, oldalt majdnem a potroh közepéig ér.

Fekete; a mellső czomb hegye és a mellső szár sárgászörös; a has töve fehér. — Hossza 3·5 mm.

*Pilis-Maróth*, 1899 máj. 19.

#### 6. *Phanerotomella nigra* ♀.

Pontozott-ránczos, rövid szőrözettel. A fej harántszéles, az arcz és a szemkeret határozatlan hossz-ránczokkal; a fejtető kerekített, a szemek mögött kiszélesedett. A csápok 30 ízből összetettek. A középtor elül a közepén barázdával van ellátva, az utótor tökéletlenül tagolt, 4 gyenge fogacskaival. A potroh durván ránczosan pontozott, elliptikus, nem hosszabb a fej és tornál, két varrattal. A szárnyjegy elliptikus, a végéből eredő sugárér kéttágú; a sugársejt háromszögalakú és rövid; a visszafutóér a második könyöksejtből veszi eredetét, nervulus az alapér mögött áll; az összes szárnyerek erősek. A lábszárak egyenesek és egyszerűek. A hátsó lábak erősek és hosszúak, a czombok meghaladják a potroh csúcsát.

Fekete; a lábak barnák, a mellső csipők és az ízületek vörösesek. A szárnyak barnák, egy harántfutó világos szalaggal. — Hossza 2·5 mm., a tojócső rövid.

*Budapest.*

#### 7. *Phanerotomella Kertészii* ♀.

A *Ph. nigra*-tól, 38 ízű csápja és épelejű középtorában különbözik. Sárgászörös; a csápostor barnás; a potroh a második íztől barna. A szárnyak tiszták, a szárnyjegy sötét. — Hossza 3 mm., a tojócső rövid. KERTÉSZ KÁLMÁN *Novi* vidékén gyűjtötte.

### Subfam. CALYPTINAE.

#### 8. *Calyptus bicolor* ♂.

A szájpajzs félkör alakú, kissé szélesebb, mint magas, töve mindkét oldalán egy-egy mély gödröskével. A csápok 26 ízűek. A középtor barázdái és a toroldalak simák. Az utótor tagolt, a középső terecske nagy és deltoid alakú, majdnem sima. Az első potrohíz hossza felér a hátsó szélességével, gyengén ránczos; a második és harmadik íz egyenlő széles és mindkettő sima, a második közel négyzet alakú. A hátsó lábak erősek és nyújtottak.

Fekete; a tapogatók, a pofák, az előtor, a középtor, a toroldalak többé-kevésbé, gyakran az utótor is, a potroh és a lábak vörösek; az első potrohíz töve sötétes, a hátsó csipő töve többé-kevésbé barna. A szárnyak tiszták, a szárnyjegy és az erezet fekete, a pikkely sárga. — Hossza 2 mm.

*Novi* környékén KERTÉSZ K. gyűjtötte (1899. VII. 6.).

## Subfam. DIOSPILINAE.

9. *Diospilus maximus* ♂ ♀.

A fej harántszéles, az arcz ránczos, a fejtető és a halánték pontozott és fénylő. A esápok 28 és 32 izzel. A középtor elszórtan pontozott, barázdái mélyek és esípkések, középső karaja púposan kidülledt. A toroldal közepe sima. Az utótör durván, sejtesen-ránczos. A sugársejt nem éri a szárny csúcsát, a második könyöksejt fönt kissé szűkített; a sugárér első ága, valamint az első és második harántkönyökerek egyenlő hosszúak; a sugárér második ága rövidebb az elsőnél. A potroh lándzsaalakú, oly hosszú, mint a fej és a tor együttvéve; első ize durván ránczos, kissé hosszabb hátsó szélességénél, oldalai szegélyezettek, a töve keskenyebb, mint a vége, mélyen kivájt és bordázott; második ize kissé rövidebb, mint széles és durván ránczos; a következő izek simák.

Fekete; a tapogatók és a lábak vörösek; a esípok feketék; a hátsó lábszár majdnem egészen és a hátsó lábízek — az 5 íz kivételével — barnák. A szárny sárgás, a szárnyjegy és az erek barnák. — Hossza 6—8 mm., a tojócső kissé hosszabb a potrohnál.

*Pilis-Maróth*, 1899 máj. 20.

\*

## Subfam. HECABOLINAE.

1. *Cænophanes cingulatus* ♀.

Hinterleib spathelförmig, das erste und zweite Segment längsfurchig, ohne Querfurchen. Flügel lang.

Schwarz; Prothorax, Fühlerbasis und Füße roth; Taster, Squamula und Stigma gelb. — Länge 3 mm., Bohrer länger als der Hinterleib.

*Szováta* (CSIKI).

2. *Hecabolus hungaricus* ♂ ♀.

Gesicht runzlig, Scheitel fein quergefurcht, Fühler 34 gliedrig, dünn. Thorax cylindrisch, runzlig; Mittellappe des Mesonotums stark, bucklig vorstehend; Metanotum gewölbt, undeutlich gefeldert. Hinterleib lanzettlich; erstes Segment grob runzlig, mit 2 Kielen; zweites Segment fast quadratisch, vorn etwas schmaler, längrunzlig, an der Mitte mit einer bogenförmigen Querfurchen, und vorn an der Mitte mit einem quadratischen, erhöhten und grob längsrunzligen Feld; drittes Segment punktirt runzlig, viertes Segment an der Basis punktirt und dann wie die Folgenden fast glatt. ♂ eben so, 4. Segment längsrunzlig, Hinterflügel mit Pseudostigma.